



# AVES

## NOBILIS ND C2

### Indicaciones

Protege contra la enfermedad de Newcastle, una enfermedad viral de las aves con una amplia variación en morbilidad, mortalidad, signos y lesiones. Nobilis ND C2 es una vacuna clonada, no patógena, que contiene una cepa lentogénica de tipo respiratorio, derivada de una cepa mutante de la Hitchner B1 sensible a temperatura y adaptada al frío con índice de Patogenicidad Intracerebral cercano a 0.

### Composición

Cada frasco contiene 5.7 - 7.5 log<sub>10</sub> EID<sub>50</sub> por dosis de virus vivo atenuado de la Enfermedad de Newcastle cepa C2.

### Administración y dosis

Puede administrarse en aves a partir del primer día de edad. Debido a que la cepa vacunal C2 es muy suave, se recomienda la revacunación luego de 2 a 3 semanas para mejorar la inmunidad. Puede aplicarse por vía oculo nasal o spray. *Aplicación oculo nasal:* reconstituir la vacuna con el diluyente Solvens Oculo Nasal y administrar con el gotero provisto. La gota debe aplicarse en un orificio de la nariz o en un ojo. Asegurar que la gota ha sido inhalada previo a liberar el ave. *Aplicación por spray:* reconstituir la vacuna con agua fría y limpia. Puede agregarse 2% de leche descremada. Se recomienda utilizar para la dilución un volumen de agua de 250 a 500 mL cada 1.000 dosis. Aplicar a 30 a 40 cm de distancia de las Aves.

### Presentación

Frascos de 1.000 dosis.

### Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar aves sanas solamente. Evitar la exposición al virus vacunal. Una vez reconstituido usar dentro de las dos horas. No usar con otras vacunas. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-5387