



# GATOS

## NOBIVAC TRICAT TRIO

### Indicaciones

Para la inmunización activa de gatos a partir de las 8 - 9 semanas de edad con el objetivo de reducir los signos clínicos y la excreción viral causados por la infección con Calicivirus Felino y virus de la Rinotraqueítis Felina; para prevenir los signos clínicos, excreción viral y la Panleucopenia causados por el virus de la Panleucopenia felina. La duración de la inmunidad es de 1 año para los componentes Calicivirus Felino y virus de la Rinotraqueítis Viral Felina y de 3 años para el virus de la Panleucopenia Felina.

### Composición

Cada dosis contiene al menos 4,6 log<sub>10</sub> UFP de Calicivirus Felino; al menos 5,2 log<sub>10</sub> UFP de virus de Rinotraqueítis Viral Felina y al menos 4,3 log<sub>10</sub> DICT50 de virus de la Panleucopenia Felina.

### Administración y dosis

Reconstituir la vacuna con Nobivac Diluent y permitir que alcance la temperatura ambiente. El contenido de vacuna reconstituida (1 mL) debe inyectarse S/C inmediatamente después de su reconstitución. *Programa de vacunación recomendado:* para la vacunación inicial se requieren dos dosis administradas S/C con un intervalo de 3 - 4 semanas. La 1° dosis se administra a una edad de 8 - 9 semanas de edad y la 2° a las 12 semanas. Puede combinarse con Nobivac Rabies como diluyente.

### Presentación

Caja con 5 frascos de 1 dosis.

### Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar solamente animales sanos. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Realizar una adecuada evaluación clínica antes de la vacunación. Luego de la vacunación, evitar el contacto con fuentes potenciales de infección respiratorias hasta 7 días después de la 2° vacunación. Debido a que el producto no ha sido evaluado en hembras gestantes o en lactación, no se recomienda el uso durante la gestación o lactación. Registro MGAP N°: 2137