



# PERROS



Chorulon  
Polvo para reconstituir solución inyectable

## Ficha técnica

### CHORULON

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) 5000 UI  
Polvo para reconstituir solución inyectable

#### Composición:

Cada frasco de polvo liofilizado contiene: Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) 5000 U.I. Excipientes c. s. p. 1 frasco.

Cada frasco de diluyente contiene: Excipientes c. s. p. 5 ml

Cada ml de solución reconstituida contiene: Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) 1.000 U.I. Excipientes c. s. p. 1 ml.

#### Indicaciones de uso:

- Mejorar la tasa de concepción en vacas y vaquillonas.
- Tratamiento de quistes foliculares (anestros, estro prolongado, ninfomanía) en vacas y vaquillonas.
- Optimización de la fertilidad en vacas y vaquillonas.
- Inducción y sincronización de la ovulación en cerdas y cachorras.
- Inducción de la ovulación en yeguas y perras.
- Anestro persistente en perras y yeguas.
- Ovulación retardada/estro prolongado en perras.

#### Especies de destino:

Bovinos (vacas y vaquillonas)

Caballos (yeguas)

Perros (perras)

Cerdos (cerdas y cachorras)

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Vía de administración: Vía intramuscular o endovenosa.

Modo de empleo: con una jeringa, retirar todo el diluyente y reconstituir el frasco de polvo liofilizado. Mezclar agitando cuidadosamente asegurando que el polvo liofilizado sea totalmente disuelto.

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Chorulon  
Polvo para reconstituir solución inyectable

## Ficha técnica

Especie animal	Indicación	Dosis y administración
Vacas y vaquillonas	Mejora índice concepción	1.500 U. I. IM o IV al momento de la IA
	Tratamiento de quistes foliculares	3.000 U. I. IV
Cerdas y cachorras	Inducción y sincronización de la ovulación	500 U. I. IM 24 horas antes de la IA
Yeguas	Inducción de la ovulación (folículos $\geq 3,5$ cm de diámetro)	1.500 – 3.000 U. I. IM o IV 24 horas antes de la IA
	Anestros (folículo $\geq 2$ cm de diámetro)	1.500 – 3.000 U. I. IM o IV Repetir si fuese necesario a los 2 días
Perras	Anestro	Después del pretratamiento con PMSG, 500 U. I. IM o IV al primer día del estro
	Ovulación retardada	100 – 800 U.I./día IM

### Contraindicaciones:

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo o alguno de sus excipientes. No administrar en hembras prepúberes.

### Advertencias y precauciones especiales de uso:

Deben tomarse las medidas asépticas necesarias al momento de la inyección. Mantener fuera del alcance de los niños.

### Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Puede ser utilizado en animales con preñez temprana (hasta 2 semanas posteriores al apareamiento/inseminación). No utilizar al final de la preñez. Puede ser utilizado durante la lactancia.

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Chorulon  
Polvo para reconstituir solución inyectable

## Ficha técnica

### Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

### Efectos no deseados o reacciones adversas:

En casos aislados, al igual que con todos los preparados proteicos, se pueden presentar reacciones anafilácticas poco después de su aplicación. En tales circunstancias, el tratamiento indicado es la administración de adrenalina (1:1000) por vía intramuscular o endovenosa. También puede estar indicada la terapia con corticosteroides.

### Período de resguardo:

Para todas las especies:

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

### Precauciones especiales para el operador:

No existen diferencias fundamentales en el efecto de HCG en humano y en animales. La HCG puede influenciar la fertilidad en humanos después de la inyección. Se debe tener cuidado con la inyección cuando se utiliza Chorulon. En caso de inyección accidental, buscar atención médica inmediata y mostrar el inserto del producto al médico. En caso de derrame accidental sobre la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

### Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura entre 2°-15°C. Proteger de la luz. Una vez reconstituido, debe ser utilizado inmediatamente.

### Presentación:

Estuche conteniendo 5 frascos con producto liofilizado y 5 frascos con solvente.

Fabricado por:

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,

Holanda.

Importado y comercializado por:

Sinervia Uruguay S. A.

Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.

Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**

Uruguay