



AVES

NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS

Indicaciones

Vacunación de pollitas de reemplazo contra la enfermedad causada por los virus de Bronquitis Infecciosa Aviar, Rinotraqueítis aviar, Enfermedad de Newcastle y el Síndrome de baja de postura.

Composición

Virus inactivados de la Bronquitis infecciosa Aviar (Cepa M41, induciendo $\geq 4.0 \log_2$ unidades VN y Cepa 274, induciendo $\geq 4.0 \log_2$ unidades VN); de la Rinotraqueítis del pavo (Cepa BUT 1#8544, induciendo $\geq 9.5 \log_2$ ELISA unidades); del Síndrome de Baja Postura (Cepa BC14, induciendo $\geq 6.5 \log_2$ unidades HI); de la Enfermedad de Newcastle (Cepa Clone 30, induciendo $\geq 4.0 \log_2$ unidades HI por 1/50 dosis o conteniendo $\geq 50 \text{ PD}_{50}$ unidades); excipientes c. s. p. 1 dosis. (0.5 ml).

Administración y dosis

Inyección de 0,5 mL IM en la pierna o pecho o SC en la parte baja del cuello. Administrar a aves de 14 - 20 semanas de edad, no antes de cuatro semanas previo a la postura.

Presentación

Frasco 500 mL (1.000 dosis).

Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar Aves sanas solamente. Dejar que la vacuna tome la temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Usar todo el contenido una vez abierto dentro de las 3 horas. No mezclar con otras vacunas. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP: en trámite