



PERROS

NOBIVAC PUPPY DP

Indicaciones

Inmunización activa contra las dos enfermedades infecciosas más importantes en cachorros, el Moquillo Canino y la Parvovirus Canina.

Composición

Contiene las cepas vivas atenuadas y liofilizadas de virus de Distemper Canino cepa VMC Onderstepoort 105 TCID50) y de Parvovirus Canino (cepa PVC 154 107 TCID50) reproducidos en cultivo celular.

Administración y dosis

Inyectable I/M, S/C. Administrar 1 mL. *Esquema de vacunación sugerido:* en cachorros 4 - 6 semanas Nobivac Puppy DP: 8 - 9 semanas Nobivac DHPPi (sola) o en combinación con Nobivac Lepto o Nobivac Rabies o Nobivac RL; 12 semanas Nobivac DHPPi (sola) o en combinación Nobivac Lepto o Nobivac Rabies o Nobivac RL. Revacunación anual.

Presentación

Caja 10 frascos de 1 dosis con diluyente.

Contraindicaciones - Precauciones

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de vacunación. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación. Este tipo de reacción puede producirse luego de la inyección de cualquier proteína extraña y en la mayoría de los casos es autolimitante.

Registro MGAP N°: A-2138