



PERROS

INCURIN

Indicaciones

Tratamiento de la incontinencia urinaria hormono - dependiente en perras.

Composición

Cada comprimido contiene: Oestriol 1 mg.

Administración y dosis

Oral. Administrar una vez al día. No existe una relación entre peso corporal y dosis efectiva final, por lo cual la dosis debe ser establecida para cada perra en particular. Se recomienda el siguiente esquema de dosificación: comenzar con un comprimido por día por una semana; si el tratamiento resulta exitoso disminuir la dosis a medio comprimido por día la semana siguiente. En caso de que el tratamiento inicial no de resultado, incrementar la dosis a dos comprimidos por día por una semana. Algunos animales no requieren de un tratamiento diario. Una vez que se ha establecido la dosis diaria eficaz se puede intentar la administración en días alternos.

Presentación

Blister de 30 comprimidos ranurados.

Contraindicaciones – Precauciones

No se produce acumulación cuando las tabletas se dan una vez por día, por lo cual los tratamientos prolongados no producen efectos secundarios. Está contraindicado en perras preñadas y menores de un año. Se han observado efectos estrogénicos leves (hinchazón de vulva y mamas y/o atracción de machos) con dosis de 2 mg; estos efectos desaparecen con la reducción de la dosis. Mantener a temperatura ambiente (15° a 25°C).

Registro MGAP N°: A-3074