



AVES

FORTEGRA

Indicaciones

Contiene oocistos vivos aislados de aves, sensibles a todos los coccidiostatos, que permite administrar un número controlado de oocistos capaces de estimular una sólida respuesta inmunitaria contra las especies de *Eimeria* económicamente importantes en el pollo parrillero (broiler). La exposición a oocistos posteriormente a la vacunación refuerza la memoria inmunológica sin alterar los parámetros productivos. Su uso protege contra la aparición de cepas resistentes, reemplazando las cepas de campo y reestableciendo la sensibilidad de las cepas resistentes a las drogas anticoccidiales.

Composición

Elaborada en Aves SPF (Specific Pathogen Free = libres de patógenos específicos), con una selección de oocistos vivos de *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. mivati* y *E. tenella*. Las cepas incluidas son altamente sensibles a drogas anticoccidiales.

Administración y dosis

Se administra al primer día de edad por aspersión con equipos Spraycox en la planta de incubación. El equipo de aplicación permite administrar 21 mL de vacuna cada bandeja de 100 pollitos BB.

Presentación

Frascos de 1.000 y 10.000 dosis.

Contraindicaciones - Precauciones

Siga atentamente las instrucciones de almacenamiento, mezclado y administración de la vacuna para evitar la disminución de título de la vacuna. Mantener a temperatura de heladera entre 2° y 8°C. No congelar; el congelado daña los oocistos esporulados. La aplicación (e ingestión) uniforme de la vacuna asegura que todas las aves comienzan el ciclo de vacuna al mismo tiempo, asegurando un desarrollo uniforme de la inmunidad.

Registro MGAP N°: 2017A00443