



AVES

AVA POX CE

Indicaciones

Protege contra la Viruela Aviar en Aves a partir de las 8 semanas de edad. **Composición**

Vacuna a virus activo replicada en embriones de pollo SPF elaborada con la cepa Cutter, liofilizada en frascos sellados al vacío. Título mínimo por dosis: 102.74

DICC50.

Administración y dosis

Administrar mediante el método de punción en el pliegue del ala en ponedoras y reproductoras. Mantener firmemente el ave y desplegar un ala hacia afuera. Sumergir ambas agujas del aplicador en el frasco. Perforar el ala expuesta con el aplicador. Sumergir nuevamente el aplicador en el frasco de vacuna y proceder con la próxima ave. Se deben observar algunas costras de 6 a 8 días posteriores a la aplicación en el punto de vacunación, lo que indica que la vacuna se administró de forma correcta. La protección a esta enfermedad se desarrolla de 10 a 14 días después de la vacunación

Presentación

Frasco de 1.000 dosis con diluyente y lanceta para aplicación en el ala

Contraindicaciones – Precauciones

Administrar en forma higiénica en Aves sanas. Evitar comprometer vasos sanguíneos, huesos o músculos durante la administración. No tocar con la vacuna otra parte que el área de aplicación. Realizar el seguimiento de la formación (normal) de costras post vacunales.

Registro MGAP N°: A-4930