



AVES

NOBILIS REO INAC

Indicaciones

Para prevención de Reovirus. Los reovirus se han asociado con otras enfermedades como síndrome de malabsorción, necrosis de la cabeza del fémur, pericarditis, miocarditis, hidropericardio, gastroenteritis, hepatitis y síndromes respiratorios crónicos. El virus se transmite verticalmente por el huevo incubable y horizontalmente por heces y por secreciones respiratorias. Se encuentra en el tracto digestivo y respiratorio de aves clínicamente sanas.

Composición

Reovirus cepa 1733 y 2408 en una emulsión de agua en aceite.

Administración y dosis

Inyectable I/M en pecho o muslo, o S/C en parte posterior del cuello. Dosis recomendada: 0,5 mL. El mejor resultado se obtiene vacunando las aves 6 semanas después de la vacunación con vacuna a virus vivo (Nobilis Reo 1133), nunca antes de las 4 semanas. No vacunar las aves dentro de las 4 semanas antes del inicio de la postura. Debe usarse en aves de 16 a 20 semanas de edad.

Presentación

Frasco 500 mL (1.000 dosis).

Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar Aves sanas solamente. Dejar que la vacuna alcance temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. No mezclar con otras vacunas. Una vez abierto usar inmediatamente. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-1917