



PERROS

NOBIVAC DHPPi

Indicaciones

Para la inmunización activa de perros contra el Moquillo Canino, la Hepatitis Infecciosa Canina producida por adenovirus canino tipo 1, infecciones producidas por adenovirus canino tipo 2, Parvovirus Canina y Parainfluenza Canina.

Composición

Cada dosis contiene al menos 104,0 DICT50 del virus del moquillo canino Cepa Onderstepoort, 104,0 DICT50 de Adenovirus Canino tipo 2 Cepa Manhattan LPV3, 107,0 DICT50 de Parvovirus Canino Cepa C154 y 105,5 DICT50 de virus de Parainfluenza Canina Cepa Cornell.

Administración y dosis

Inyectable S/C. Administrar 1 mL. Reconstituir utilizando Nobivac Diluent, Nobivac Lepto o Nobivac RL. Deberá administrarse dentro de los 30 minutos posteriores a su reconstitución. *Esquema de vacunación sugerido:* en cachorros de 4 - 6 semanas Nobivac Puppy DP; 8 - 9 semanas Nobivac DHPPi (sola) o en combinación con Nobivac Lepto o Nobivac Rabies o Nobivac RL; 12 semanas Nobivac DHPPi (sola) o en combinación con Nobivac Lepto o Nobivac Rabies o Nobivac RL. Revacunación anual.

Presentación

Caja 10 frascos de 1 dosis con diluyente.

Contraindicaciones - Precauciones

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de vacunación. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación. Este tipo de reacción puede producirse luego de la inyección de cualquier proteína extraña y en la mayoría de los casos es autolimitante.

Registro MGAP N°: A-2136