



AVES

NOBILIS GUMBORO INAC

Indicaciones

La Enfermedad Infecciosa de la Bolsa o Enfermedad de Gumboro es una enfermedad de las aves que afecta principalmente la Bolsa de Fabricio, un órgano importante en aves jóvenes con un aparato inmunitario en desarrollo. El agente causal destruye los linfocitos B inmaduros en la Bolsa de Fabricio y produce inmunosupresión. El control de la enfermedad se consigue a través de las medidas de bioseguridad y vacunación.

Composición

Emulsión de agua en aceite con virus inactivado de la Enfermedad de Gumboro Cepa D78 $\geq 14.5 \log_2$ unidades VN unidades/dosis.

Administración y dosis

Inyectable I/M en muslo o pecho, o S/C en parte baja del cuello. Administrar 0.5 mL por ave, entre las 16 a 20 semanas de edad, nunca antes de las 4 semanas anteriores al comienzo de la postura. El mejor efecto booster se obtiene con una primovacuna con virus vivo, revacunando con Nobilis Gumboro Inac a las 6 semanas o más de vida.

Presentación

Frasco 500 mL (1.000 dosis).

Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar aves sanas solamente. Agitar bien antes de usar. No mezclar con otras vacunas. Una vez abiertos los frascos deben ser usados dentro de las 3 horas.

Registro MGAP N°: A-1900