



PERROS

COLLAR SCALIBOR

Indicaciones

La Leishmaniasis es una enfermedad del perro y el hombre provocada por el protozoo *Leishmania*, que desarrolla su ciclo biológico en parte en el tracto digestivo de mosquitos (flebótomos) y en parte en el interior de células mononucleares fagocitarias de varios vertebrados, entre ellos el perro y el hombre. El perro es considerado el principal reservorio epidemiológico.

En América Latina, *Leishmania infantum* produce la forma visceral de la enfermedad, que se caracteriza por afectar diferentes órganos en perros y seres humanos. Las medidas de control para la Leishmaniasis a través del control del único reservorio doméstico (el perro) deberían integrar tres aspectos: **1) vigilancia de la infección en el perro, 2) protección de perros en riesgo de infección con el collar Scalibor, y 3) medidas en contra del vector para prevenir la transmisión a perros libres de la infección y control de la transmisión de perros infectados a otros perros.**

El collar Scalibor ha sido estudiado en distintas áreas del mundo frente a diferentes especies del vector (flebótomos). Posee efecto repelente, anti alimentación y letal sobre los flebótomos durante 5 a 6 meses.

Composición

Deltametrina 4% (eq. a 40 g/kg, integrada a la matriz del collar), estabilizadores, agentes colorantes y material plástico no más del 96%.

Administración y dosis

Luego de retirar del envase, sacudir el collar antes de colocarlo en el perro. Es conveniente mantener el collar en contacto con la piel, debido a que el principio activo se dispersa por la capa lipídica de la misma y se distribuye por todo el cuerpo del animal; no actúa por evaporación como los collares convencionales. El collar protege durante 35 semanas contra *Lutzomyia sp.* (flebótomos). La Deltametrina (DTM) está fuertemente ligada al excipiente Trifenilfosfato (TPP), formando el complejo DTM + TPP. El principio activo se libera progresivamente con el roce con la piel y el pelo. La acción se ejerce por efecto repelente evitando que los insectos se alimenten e incluso picar, provocando su muerte.



Sinervia

Francisco Bonilla 549
San José de Carrasco,
Canelones, Uruguay
(T) +598 2682 8282

Victoriano Acuña 5851
Asunción, Paraguay
(T) +595 21 66 47 15

info@sinervia.com
sinervia.com

Presentación

Caja con 6 collares de 48 cm (razas pequeñas y medianas) ó 65 cm (razas grandes).

Contraindicaciones - Precauciones

No utilizar en cachorros menores de 7 semanas. No aplicar en animales que muestren extensas lesiones de piel. Conservar a temperatura inferior a los 25°C.

Registro MGAP N°: A-4236



Sinervia

Francisco Bonilla 549
San José de Carrasco,
Canelones, Uruguay
(T) +598 2682 8282

Victoriano Acuña 5851
Asunción, Paraguay
(T) +595 21 66 47 15

info@sinervia.com
sinervia.com