



# PERROS



Incurin  
Vía oral

## Ficha técnica

### INCURIN

Tratamiento de incontinencia urinaria en perras.

#### Composición:

Cada comprimido contiene 1 mg de Estriol.

Excipientes: amilopectina, estearato de magnesio, almidón de papa y lactosa.

#### Descripción:

Estriol es un estrógeno natural de acción corta que es eficaz para el tratamiento de la incontinencia urinaria hormono-dependiente en perras. Luego de la administración oral, el estado de equilibrio se alcanza al segundo día de tratamiento y no se produce acumulación luego de múltiples dosis. Debido a su corta acción, Incurin no causa supresión de la médula ósea y es seguro incluso luego de tratamientos prolongados.

#### Indicaciones:

Incurin está indicado para el tratamiento de incontinencia urinaria hormono-dependiente debida a incompetencia del mecanismo del esfínter en perras.

#### Especies de destino:

Caninos.

#### Dosis y administración:

Incurin se administra por vía oral una vez al día. Debido a que no existe una relación entre el peso corporal y la dosis efectiva final, no es posible indicar una dosis precisa por kg. La dosis debe ser establecida para cada perra en particular. Se recomienda el siguiente esquema de dosificación:

- Comenzar con un comprimido por día durante una semana.
- Si el tratamiento resulta exitoso, disminuir la dosis a medio comprimido por día durante una semana.
- En caso de que el tratamiento inicial no dé resultado, incrementar la dosis a dos comprimidos por día.
- Algunos animales no requieren de un tratamiento diario.
- Una vez que se ha establecido la dosis diaria eficaz se puede intentar la administración en días alternos.

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Incurin  
Vía oral

## Ficha técnica

### **Contraindicaciones y advertencias:**

El empleo de Incurin está contraindicado durante la gestación y en perras de menos de un año. Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

### **Efectos indeseables:**

Con la dosis de 2 mg se han observado efectos estrogénicos leves tales como hinchazón vulvar y mamaria y/o atracción hacia los machos. Estos efectos desaparecen al reducir la dosis. También se han descrito náuseas en algunos animales. Debido a su corta acción, Incurin no causa supresión de la médula ósea en las perras.

### **Conservación:**

Conservar a temperatura ambiente (15-25°C).

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay