



# AVES

## NOBILIS TRT INAC

### Indicaciones

El Metapneumovirus (MPV) causa principalmente problemas en pavos y en pollos y gallinas. Los faisanes y las gallinas de guinea también son susceptibles y se han demostrado anticuerpos contra el virus en aves silvestres y en otras especies domésticas. El virus tiene dos sitios importantes de replicación: tracto respiratorio y tracto reproductivo. Inicialmente causa una enfermedad respiratoria en aves infectadas y puede también causar una caída en la producción en ponedoras y reproductoras. El control del MPV se consigue mediante medidas de bioseguridad y vacunación.

### Composición

Contiene virus inactivado de TRT cepa BUT (1) 8544, 50 unidades de Elisa induciendo 9 log<sup>2</sup> títulos en Elisa.

### Administración y dosis

Aplicar por vía I/M en el muslo o pechuga, o S/C en la parte baja del cuello. Dosis recomendada: 0,5 mL/ave. Administrar a las 16 - 18 semanas de edad.

### Presentación

Frascos 500 mL (1.000 dosis).

### Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar aves sanas solamente. Permitir que la vacuna tome la temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Usar todo el contenido una vez abierto dentro de las 3 horas. No mezclar con otras vacunas. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-4950