



GATOS

BRAVECTO SPOT ON

Indicaciones

El principio activo de Bravecto Spot On Gatos (Fluralaner) es un antiparasitario de acción sistémica perteneciente a la clase isoxazolinas. Fluralaner es un potente inhibidor del sistema nervioso de los artrópodos. Actúa antagonizando los canales de cloro estimulados por ligandos, receptores GABA (ácido gamma aminobutírico) y receptores glutamato. Bravecto Spot On Gatos está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones de pulgas y para el tratamiento y control de infestaciones por garrapatas que proporciona 1) actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*), 2) actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Las pulgas y garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El efecto comenzará en las 8 horas siguientes a la fijación para las pulgas y 12 horas para las garrapatas. El producto controla eficazmente las poblaciones de pulgas en las áreas a las cuales tienen acceso los gatos tratados.

Composición

Fluralaner 280 mg; excipientes c. s. p. 1 mL.

Cada pipeta contiene:	Contenido de la pipeta (ml)	Fluralaner (mg)
Para gatos medianos (>2,8 – 6,25 kg)	0,89	250
Para gatos grandes (>6,25 – 12,5 kg)	1,79	500

Administración y dosis

Para uso tópico. Aplique una pipeta de Bravecto Spot On Gatos de 250 mg para gatos entre 2,8 y 6,25 kg. de peso; una pipeta de Bravecto Spot On Gatos 500 mg para gatos entre 6,25 y 12,5 kg de peso. Para gatos superiores a 12,5 kg. de peso, utilice una combinación de pipetas que se ajuste lo más posible a su peso.

Paso 1: Inmediatamente antes de usar, abra el sobre y saque la pipeta. Ésta debe sostenerse en posición vertical (la punta hacia arriba) por la base o por la parte rígida superior debajo de la tapa. La tapa debe rotarse completamente en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a éstas. La tapa se mantendrá adherida a la pipeta; no es posible desprenderla. La pipeta estará abierta y lista para usarse cuando sienta que el sello se ha roto. **Paso 2:** Para facilitar la aplicación, el gato debe estar de pie o echado con la espalda colocada horizontalmente. Coloque la punta de la pipeta en la base del cráneo del gato. **Paso 3:** Presione suavemente la pipeta y aplique todo el contenido de la solución sobre la piel del gato. El producto debe aplicarse en un sólo punto en la base del cráneo en gatos de hasta 6.25 kg de peso y en dos puntos diferentes en gatos de más de 6.25 kg de peso. Esquema de tratamiento: para el mejor control de la infestación por garrapatas o pulgas, el producto debe administrarse a intervalos de 12 semanas.

Presentación

Pipetas de 0,89 y 1,79 ml.

Contraindicaciones – Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 15°C a 30°C. Mantener al resguardo de la luz. Las pipetas deben conservarse dentro del sobre para evitar la pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los sobres deben abrirse justo antes de ser utilizados. Advertencias de uso: el riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos se reduce substancialmente debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida. Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos a fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse el riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos si las condiciones no son favorables. Precauciones especiales para uso en animales: se debe tener cuidado para evitar el contacto del producto con los ojos del animal. No se utilice directamente sobre lesiones de la piel. A falta de datos disponibles, este producto de uso veterinario no debe utilizarse en gatitos de menos de 11 semanas de edad y/o gatos que pesen menos de 1.2 kg. El producto no debe administrarse a intervalos menores a 8 semanas, ya que la seguridad de su aplicación a intervalos más cortos no ha sido probada. Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento de uso veterinario a los animales: mantenga el producto en su empaque original hasta el momento de su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. Una pipeta usada debe descartarse de inmediato. Este producto y la piel humedecida de un animal recién tratado pueden ser ligeramente irritantes para la piel y/o los ojos. Evite el contacto con la piel y/o los ojos, incluyendo el contacto de manos a ojos. No comer, beber ni fumar mientras se esté manipulando el producto. Inmediatamente después de utilizar el producto lavarse cuidadosamente con agua y jabón las manos y la piel que han estado en contacto con el mismo. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua. En caso de ingestión accidental, consulte a un médico y muéstrele el prospecto del empaque o la etiqueta del producto. No toque ni permita que los niños toquen el lugar de aplicación hasta que esté seco. El producto es altamente inflamable. Manténgase alejado del calor, chispas, flamas abiertas u otras fuentes de combustión. Gestación, lactancia o fertilidad: la seguridad del producto de uso veterinario no ha sido establecida durante la gestación y la lactancia. Utilice únicamente después de que

el médico veterinario responsable evalúe el riesgo/beneficio. Interacción con otros productos médicos y otras formas de interacción: ninguna conocida. Fluralaner se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas y podría competir con otros medicamentos de alta afinidad a proteínas tales como los antiinflamatorios no esteroides (AINES) y warfarina derivada de cumarina. La incubación de fluralaner en presencia de carprofeno o warfarina en el plasma del gato a concentraciones plasmáticas máximas esperadas no reduce la unión a proteínas de fluralaner, carprofeno o warfarina. Durante las pruebas de laboratorio y las pruebas clínicas en campo no se observaron interacciones entre Bravecto Spot On solución tópica para gatos y los medicamentos de uso veterinario generalmente utilizados. Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos):

se demostró la seguridad del producto en gatitos de 11 - 13 semanas de edad y con un peso de entre 1,2 y 1,5 kg tratados en tres ocasiones a intervalos más cortos que los recomendados (intervalos de 8 semanas) con sobredosis hasta 5 veces mayores que la dosis máxima indicada. La absorción del producto a la dosis máxima recomendada fue bien tolerada por lo gatos, exceptuando algunos signos como salivación autolimitada y tos o vómito inmediatamente después de su administración por vía oral. Los medicamentos no deben descartarse vertiéndolos en aguas residuales o en la basura doméstica. Pregunte a su médico veterinario cómo descartar los medicamentos que ya no se necesitan. Estas medidas tienen como objetivo proteger el medio ambiente.

Registro MGAP N°: 2019A00699