



AVES

NOBILIS IB + ND + EDS

Indicaciones

Protección contra la Bronquitis Infecciosa Aviar (enfermedad viral que afecta aves de todas las edades), Enfermedad de Newcastle (enfermedad altamente contagiosa de las aves) y Síndrome de Baja Postura (enfermedad producida por un adenovirus - EDS-76 - que afecta a gallinas ponedoras y reproductoras en etapa de postura).

Composición

Virus de Bronquitis Infecciosa inactivado cepa M-41, induce $\geq 6.0 \log_2$ unidades de HI; virus de la Enfermedad de Newcastle cepa Clone 30 induce ≥ 50 unidades PD50, virus del Síndrome de Baja Postura cepa BC14 induce $\geq 6,5 \log_2$ unidades de HI.

Administración y dosis

Inyectable I/M en muslo o pechuga, o S/C en parte posterior del cuello. Vacunar aves entre las 16 y 20 semanas, antes de las cuatro semanas previstas para el inicio de la postura. Las aves deben ser previamente vacunadas con vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa Aviar y la Enfermedad de Newcastle. Se observan mejores resultados cuando la vacunación con la vacuna inactivada se realiza al menos 6 semanas después de la administración de la vacuna viva, pero en ningún caso debe administrarse durante las 4 semanas siguientes de la primovacunación con el serotipo variante.

Presentación

Frasco 500 mL (1.000 dosis).

Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar solo aves sanas. Permitir alcanzar la temperatura ambiente (15° a 25°C) antes de la administración. Utilizar un equipo de inyección estéril. Utilizar el contenido inmediatamente después de abierto. No mezclar con otras vacunas.

Registro MGAP N°: A-1912