



AVES

NOBILIS SG 9R

Indicaciones

Contiene una cepa viva rugosa de *Salmonella gallinarum* denominada 9R, la cual ha sido usada extensamente en el control del Tifus aviar. *S. gallinarum* y *S. enteritidis* poseen estructuras antigénicas similares. Por esta razón, Nobilis SG 9R induce una excelente protección cruzada contra *S. enteritidis*, confirmada en el laboratorio y en las pruebas de campo. La cepa ha mostrado ser estable hasta por más de 50 pasajes en huevos embrionados y 5 pasajes en Aves susceptibles, sin reversión a virulencia. A diferencia de otras vacunas contra Salmonella, no se produce transmisión horizontal entre las Aves.

Composición

Bacterias viables de *Salmonella gallinarum* cepa 9R, con un mínimo de 5×10^7 Unidades Formadoras de Colonias.

Administración y dosis

Inyectable S/C en parte media posterior del cuello. La vacuna debe ser diluida en diluyente FD Poultry. Aplicar 0.2 mL por ave. Vacunar a partir de las 6 semanas de edad y revacunar a las 14 - 16 semanas. En zonas de alto riesgo revacunar a las 12 semanas. Se recomienda la vacunación parenteral. Sin embargo, si las condiciones lo requieren, puede realizarse la revacunación en el agua de bebida.

Presentación

Frasco de 1000 dosis.

Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar Aves sanas solamente. Una vez reconstituida utilizar dentro de las 2 horas. Evitar el uso de antibióticos por 7 días antes de la vacunación y 14 días post vacunación. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-2853