



AVES

NOBILIS RT + IB MULTI + G + ND

Indicaciones

Vacuna combinada inactivada para la protección de infecciones producidas por neumovirus (Rinotraqueitis Aviar), Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro (o Enfermedad Infecciosa de la Bolsa) y Enfermedad de Newcastle.

Composición

Virus de la Bronquitis Infecciosa inactivado (serotipo Massachusetts y D207) cepas M41 y D274 inductor de al menos 4 log₂ VN unidades/dosis; virus de la Rinotraqueitis Aviar inactivado cepa BUT1#8544, inductor de al menos 9.5 log₂ ELISA unidades/dosis; virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa inactivado (cepa D78) inductor de al menos 14.5 log₂ VN unidades/dosis y virus de la Enfermedad de Newcastle inactivado inductor de al menos 4 log₂ HI por dosis, en una suspensión de agua en aceite.

Administración y dosis

Inyectable I/M en muslo o pechuga, o vía S/C en parte baja del cuello, Aplicar 0.5 mL de vacuna. Se recomienda la administración en reproductoras que han recibido una primo vacunación a virus vivo. El plazo ideal es 6 semanas o más después de la primo vacunación, pero no antes de las 4 semanas.

Presentación

Frasco 500 mL (1.000 dosis).

Contraindicaciones – Precauciones

Vacunar Aves sanas solamente. Dejar que la vacuna tome la temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Usar todo el contenido una vez abierto dentro de las 3 horas. No mezclar con otras vacunas. Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-3563