



# PERROS

## NOBIVAC KC

### Indicaciones

Para proteger a perros contra *Bordetella bronchiseptica* y el virus de la Parainfluenza Canina durante los períodos de mayor exposición y riesgo de la Tos de las Perreras. Reduce los signos clínicos y la transmisión de los agentes.

### Composición

Cada dosis (0.4mL) contiene al menos 108.3 UFC de la Cepa viva B-C2 de *Bordetella bronchiseptica* y al menos 102.8 TCID<sub>50</sub> del virus de la Parainfluenza canina, agentes etiológicos de la tos de perreras.

### Administración y dosis

Está recomendado el uso de Nobivac KC a partir de las 3 semanas de edad cuando el riesgo de infección con la Tos de las Perreras es significativo. Nobivac KC se administra 72 horas antes del periodo de riesgo, o conjuntamente con Nobivac Puppy DP o Nobivac DHPPi a las 4 - 6 semanas de edad. La edad mínima de vacunación con Nobivac KC es al menos 2 semanas de edad. La revacunación se aplica antes del periodo de riesgo o anualmente. La protección parcial se logra a partir de las 48 horas después de la vacunación. La inmunidad completa (local y sistémica) se alcanza después de 72 horas sin necesidad de revacunación. La inmunidad dura aproximadamente 1 año. Sin embargo, se recomienda la revacunación de perros en situaciones de alto riesgo cada 6 meses (razas braquicefalicas, animales de criaderos y hospedajes). Permitir que el diluyente alcance la temperatura ambiente. Reconstituir la vacuna liofilizada en forma aséptica con el diluyente estéril. Una vez reconstituida, cambiar la aguja por el aplicador incluido. Fijar la cabeza del perro en posición vertical normal. Colocar el aplicador frente a uno de los orificios nasales y administrar toda la dosis (0.4 mL) dentro de la fosa nasal. La vacuna debe ser usada dentro de la hora siguiente a su reconstitución. Vacunar exclusivamente perros sanos; realizar examen clínico antes de la vacunación. Puede aplicarse en hembras gestantes.

### Presentación

Caja de 5 frascos de vacuna liofilizada con diluyente (0,4 mL) con 5 aplicadores.

## Contraindicaciones – Precauciones

Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado. Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta completado el plan básico de vacunación. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación. Este tipo de reacción puede producirse luego de la inyección de cualquier proteína extraña y en la mayoría de los casos es autolimitante.

Registro MGAP N°: A-2136



Francisco Bonilla 549  
San José de Carrasco,  
Canelones, Uruguay  
(T) +598 2682 8282

Victoriano Acuña 5851  
Asunción, Paraguay  
(T) +595 21 66 47 15

info@sinervia.com  
sinervia.com