



AVES

NOBILIS IB MA5

Indicaciones

La Bronquitis Infecciosa (IB) es una enfermedad viral que afecta a las aves (Pollos y Gallinas) de todas las edades. El virus de la Bronquitis Infecciosa (VBI) no solamente ataca el tracto respiratorio sino también el tracto urogenital. El VBI causa una enfermedad respiratoria en aves infectadas y también pérdidas de producción en ponedoras y reproductoras; puede producir daño a los riñones. Los daños renales asociados a infecciones por diversas cepas del virus de la Bronquitis Infecciosa se encuentran en aumento, especialmente en parrilleros (broilers).

Composición

Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar vivo, Cepa Ma5 $\geq 3,0 \log_{10}$ DIE50.

Administración y dosis

Oral, spray o instilación óculo - nasal. Puede administrarse a partir de 1 día de edad. En parrilleros (broilers): vacunar al primer día por spray con gota gruesa o instilación óculo - nasal. En ponedoras y reproductoras: vacunar al primer día por spray gota gruesa o instilación óculo - nasal; revacunar por spray, instilación óculo - nasal o agua de bebida a las 6 semanas aproximadamente. En el agua de bebida, los frascos deben ser abiertos bajo el agua. Usar agua fría, limpia y libre de cloro o hierro. Es recomendable añadir 2 g de leche en polvo por litro de agua, lo que aumenta el tiempo durante el cual el virus se mantiene activo. Las aves deben beber toda el agua medicada dentro de 2 horas. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser recomendable privar a las Aves de agua antes de la vacunación. Es esencial contar con un número suficiente de bebederos para proveer de espacio adecuado a las aves. El agua debe estar limpia y libre de trazas de detergentes y desinfectantes. Disolver 1.000 dosis en la cantidad de agua que beben las aves, dependiendo de la edad y el clima, en un máximo de 40 litros. La vacuna debe ser administrada temprano en la mañana, momento de mayor consumo de agua, o en el momento más fresco de un día caluroso. Cuando se está vacunando grandes grupos de aves, es recomendable comenzar disolviendo solo parte de la vacuna. La administración por spray o por la gota óculo nasal genera mejor respuesta y se recomienda especialmente cuando se vacunan aves jóvenes.

Presentación

Frascos de 1.000 y 5.000 dosis.

Contraindicaciones - Precauciones

Vacunar Aves sanas solamente. Una vez abierto el frasco utilizarlo inmediatamente.
Conservar entre 2° y 8°C.

Registro MGAP N°: A-1913