



# PERROS



Bravecto  
Vía oral

## Ficha técnica

### Bravecto

Comprimidos masticables para perros.

#### Composición:

Cada gramo contiene:

Fluralaner (micronizado): 136,4 mg

Excipientes c. s. p.: 1,0 g

Bravecto comprimidos masticables	Fluralaner (mg)
Para perros muy pequeños (2 - 4,5 kg)	112,5
Para perros pequeños (>4,5 – 10 kg)	250
Para perros medianos (>10 – 20 kg)	500
Para perros grandes (>20 – 40 kg)	1.000
Para perros muy grandes (>40 – 56 kg)	1.400

#### Indicaciones de uso:

Para el tratamiento y prevención de infestaciones con pulgas y garrapatas en perros durante 12 semanas.

- Este medicamento veterinario es un insecticida y acaricida sistémico de duración prolongada que mata de forma inmediata las garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus* adultas y jóvenes), pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y ácaros (*Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei* y *Otodectes cynotis*). Sobre pulgas y garrapatas posee una actividad que persiste durante 12 semanas. Para exponerse a la sustancia activa, las pulgas y garrapatas deben aferrarse al huésped y alimentarse. El producto comienza a hacer efecto dentro de las primeras 8 horas desde que la pulga se adhiere al huésped (*C. felis*) y 12 horas en el caso de garrapatas (*I. ricinus*).
- Se puede aplicar como parte del tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP).
- El producto controla de forma efectiva la población de pulgas que se encuentran en el ambiente donde habitan los perros.

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Bravecto  
Vía oral

## Ficha técnica

- Para el tratamiento de sarna demodéfica causada por el ácaro *Demodex canis*. En un estudio controlado el tratamiento con fluralaner resultó en la eliminación completa de los ácaros *Demodex spp* de los perros tratados.
- Para el tratamiento de sarna sarcóptica y las infestaciones por el ácaro *Otodectes spp*. Una sola aplicación de Bravecto vía oral, es altamente efectiva ante las infestaciones de *Sarcoptes scabiei* y de *Otodectes cynotis*, alcanzando una eficacia del 100% y del 99.8% respectivamente a los 28 días de tratados. El tratamiento mostró una reducción de las lesiones en la piel y un incremento en el crecimiento del pelo en el caso de sarna sarcóptica y una disminución de los detritos y cerumen asociado a la infestación con *O. cynotis*.
- El producto reduce la transmisión de *Babesia canis* en perros.
- En un estudio de laboratorio se comprobó que un solo tratamiento reduce el riesgo de transmisión de *Dipylidium caninum* desde pulgas infestadas a perros susceptibles durante 12 semanas.

**Especies de destino:**  
Caninos.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:**

Uso oral. No se deben romper o dividir los comprimidos masticables. Administre en el momento de la alimentación o cerca del horario de la misma. Bravecto es un comprimido masticable muy aceptado por los perros. Si el perro no ingiere el comprimido de forma voluntaria puede administrarse con el alimento o directamente en la boca. Se deberá observar el perro durante la administración para comprobar que haya ingerido el comprimido. Los comprimidos masticables Bravecto deben aplicarse según la siguiente tabla (corresponde a una dosis de 25-56 mg fluralaner/kg dentro de cada rango de peso):

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Bravecto  
Vía oral

## Ficha técnica

Peso corporal del perro (kg)	Bravecto 112,5 mg	Bravecto 250 mg	Bravecto 500 mg	Bravecto 1.000 mg	Bravecto 1.400 mg
2 – 4,5 kg	1				
>4,5 – 10 kg		1			
>10 – 20 kg			1		
>20 – 40 kg				1	
>40 – 56 kg					1

Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al producto.

Descartar el material de empaque como residuo domiciliario. El producto no usado se deberá descartar según normas locales.

### Administración durante la preñez y la lactancia:

El producto puede ser utilizado en perras preñadas y en lactancia.

### Seguridad:

Se demostró la seguridad del producto en perras preñadas y en lactancia tratadas con una sobredosis de hasta 3 veces la dosis máxima recomendada. Se demostró la seguridad del producto en cachorros de 8-9 semanas de edad y 2 - 3,6 kg de peso tratados con una sobredosis de hasta 5 veces la dosis máxima recomendada en 3 ocasiones a intervalos menores (8 semanas) que el indicado.

El producto fue bien tolerado en perros Collies con deficiencia de la proteína de resistencia a múltiples drogas 1 (MDR1 - / -) luego de una administración única de 3 veces la dosis indicada.

### Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Ninguna conocida. Durante los estudios clínicos realizados, no se observaron interacciones entre Bravecto y ninguno de los medicamentos de uso habitual.

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay



# PERROS



Bravecto  
Vía oral

## Ficha técnica

### **Efectos no deseados o reacciones adversas:**

Se observaron casos aislados (1,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios en los estudios clínicos como diarrea, vómitos, inapetencia, babeo relacionado a la vía de administración del producto. En raras ocasiones se reportaron casos de letargia, temblor muscular, ataxia y convulsiones. La mayoría de las reacciones adversas reportadas se autolimitaron y fueron de corta duración.

### **Almacenamiento:**

Mantener este producto a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C.  
Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz.

### **Precauciones para la eliminación del producto no usado o materiales de desecho:**

Descartar el material de empaque como residuo domiciliario. El producto no usado se deberá descartar según normas locales.

### **Presentación:**

Envase conteniendo 1 comprimido masticable (112,5 mg; 250 mg, 500 mg, 1000 mg ó 1400 mg).

**Elaborado en: Austria.**

Importado y comercializado por:  
Sinervia Uruguay S. A.  
Francisco Bonilla 549. San José de Carrasco, Uruguay.  
Director Técnico: Dr. Juan Pablo Lezama



**Sinervia**  
Uruguay