



PERROS

BRAVECTO

Indicaciones

Contiene fluralaner, un moderno insecticida y acaricida sistémico, como comprimidos masticables de alta palatabilidad. Está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones de garrapatas y pulgas en perros y para el tratamiento de la sarna demodéica causada por *Demodex canis*. Posee actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para, 1) matar pulgas (*Ctenocephalides felis*) y 2) matar garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* y *D. variabilis*) y 3) matar ácaros (*Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei* y *Otodectes cynotis*). Puede ser utilizado como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). Fluralaner bloquea la entrada y salida normales de iones en las neuronas, provocando parálisis y muerte de las pulgas y las garrapatas. Las pulgas mueren antes de poner huevos, contribuyendo a reducir la contaminación del ambiente. Luego de la administración oral, fluralaner se absorbe rápidamente alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 1 día. La comida mejora la absorción. Fluralaner se distribuye sistémicamente y alcanza las concentraciones más altas en tejido graso, seguido por el hígado, riñón y músculo. La persistencia prolongada y eliminación lenta desde el plasma ($t_{1/2} = 12$ días) proporciona concentraciones efectivas del fluralaner durante el intervalo entre dosis. La principal vía de eliminación es la excreción del fluralaner inalterado en heces (~90% de la dosis). El aclaramiento renal es la vía de eliminación menor.

Composición

Bravecto para perros muy pequeños (2 a 4,5 kg): Fluralaner 112,5 mg. Bravecto para perros pequeños (>4,5 a 10 kg): Fluralaner 250 mg. Bravecto para perros medianos (>10 a 20 kg): Fluralaner 500 mg. Bravecto para perros grandes (>20 a 40 kg): Fluralaner 1.000 mg. Bravecto para perros muy grandes (>40 a 56 kg): Fluralaner 1.400 mg.

Administración y dosis

Vía oral. La comida mejora la absorción; se recomienda administrar con la comida o cerca de la hora de comer. Bravecto es un comprimido masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no acepta el comprimido voluntariamente, también puede administrarse con la comida o directamente en la boca. Debe observarse al perro durante la administración para asegurarse que el comprimido es tragado. Los comprimidos masticables no deben romperse o dividirse. *Esquema de tratamiento:* para un control óptimo de la infestación de pulgas, debe administrarse a intervalos de 12 semanas.

Presentación

Caja con 1 comprimido.

Contraindicaciones – Precauciones

En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg. No administrar a intervalos inferiores a 8 semanas debido a que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. En las pruebas clínicas se observaron reacciones adversas (1,6% de los perros tratados) como efectos gastrointestinales leves y transitorios (disminución del apetito, diarrea, vomito, inapetencia y salivación).

Registro MGAP N°: Bravecto 112,5 mg: 2015A00242; Bravecto 250 mg: 2015A00241; Bravecto 500 mg: 2015A00240; Bravecto 1000 mg: 2015A00239; Bravecto 1.400 mg: 2015A00238.